

גביסקן נוול מנטה

רכוב:

החומר(ים) הפעילים וכמותם/רכיבים:
Sodium Alginate 50mg/ml, Sodium Bicarbonate 26.7mg/ml, Calcium Carbonate 16mg/ml
החומרים הבלתי פעילים:
Purified Water, Carbomer, Methylparaben, Sodium Hydroxide, Sodium Saccharin,
Propylparaben, Peppermint oil.

כל כפיה (5 מ"ל) של התכשיר מכילה 60.5 מ"ג נתרן.
לא גלוטן
לא סוכר

פעילות רפואית: להקלת ביצתת וביעות עיכול.

התווית מאושרו:
טיפול בסימפטומים של רפלוקס (העלאת מזון) קיבתי, בגין הקשיים לרפלוקס
(העלאת מזון) קיבתי, צרבת של הרין, בכל התקנים של מצוקה רום ביטנית או של
அஹוי עצם החזה, כשהסבירה הבסיסית היא רפלוקס (העלאת מזון) קיבתי.

מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש אם ידועה ריגשות לאחד ממרכבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול:
אם עלי' להגביל את כמות הנתרן או הסידן בתזונתך.

תגובהות בין תרופות:
אם הין נסולט/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך
לחזור לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובהות בין-תרופיות.

תגובהות לוואי:
בנוסח לפעילות הראשית של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי
כגון: פריחה בעור, קיזי נשימה. בקרה מה יש להתייעץ ברופא.
מקירה של לקיחת כמות דוליה מדי עלולה להופיע תחושות נפיחות. אם הנפיחות
איינה עוברת יש להתייעץ עם רופא.
בכל מקרה שבו יזכיר מרגישה תגובה לוואי של ציאנו בעלוון זה, או אם חל שינוי
בהרגשות הכללית עלי' להתייעץ עם הרופא מי.

מינון מקובל בהעדר הרואה אחרית מטופף:
מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 10–20 מ"ל (4–2 כפיפות) אחרי האוכל ולפני השינה,
עד 4 פעמיים ביום.
ילדים בין 6–12 שנים: 5–10 מ"ל (2–1 כפיפות) אחרי האוכל ולפני השינה, עד 4
פעמיים ביום.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6.
אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

שים לב:
יש להזכיר פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות
אחרות דרך הפה.

אופן השימוש:
לנער ורטב לפני השימוש.
יש ליטו התרופה אחורי אරוחה ולפני השינה.

מע הרעלון:
תרופה זו או תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או
תינוקות ועל-ידי קר תגען הרעלון. עם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל-ליד מן
התרופה, פה מייד לדוד מזון של בית-חולם, ובaba ריות התרופה איתה.
אל תגרום להקאה ללא הרואה מפושת בחושך!
אין ליטול תרופות בחושך!
דוקן/תירוע והמנה בכל פעע שהינך נוטל/ת תרופה. רוכבי/ משקפים אם הין
זקוק/ה להם.

אחסנה:
במקום קיריר מתחת 30°C . לא במקדר או במקפיא!
גם לפאי תנאי הארייה/החסנה המומלץ, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התיפה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עלי' להיוועץ ברופא.
שפוךן לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באזורה אריהה.

מספר רישום התרופה: 00-31756-7-67-141
צ'רן: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., England
בעל הרישום: רקס'ט בנקייר (נייר איסט) בע"מ, הנגר, 6, הוד השרון 45240.
פורמת עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי ספטמבר 2009.

GAVISCON PEPPERMINT LIQUID

Composition:

Active ingredients and their quantity:

Sodium Alginate 50mg/ml, Sodium Bicarbonate 26.7mg/ml, Calcium Carbonate 16mg/ml

Inactive ingredients:

Purified Water, Carbomer, Methylparaben, Sodium Hydroxide, Sodium Saccharin, Propylparaben, Peppermint oil.

Each teaspoonful (5 ml) of the preparation contains 60.5 mg Sodium.

No Gluten

No sugar

Therapeutic Activity: Relief of heartburn and indigestion.

Approved indications:

Treatment of gastro reflux symptoms, flatulence associated with gastric reflux, heartburn of pregnancy, all cases of epigastric and retrosternal distress where the underlying cause is gastric reflux.

When should this medicine not be used?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients.

Do not use this drug without consulting your physician:

if you have to limit the sodium or calcium in your diet.

Drug Interactions:

If you are taking other medicines concomitantly, or have just completed another drug treatment, inform your physician in order to prevent hazards or inefficacy arising from drug interactions.

Side Effects:

In addition to the desired effect of the drug, some side effects may appear such as: skin rash, difficulties in breathing. In these cases consult a physician

In case too big dosage has been taken, there might appear a sensation of swelling. If this sensation does not stop, consult a physician.

If you experience side effects not mentioned in this insert, or if you feel any change in your general wellbeing, consult the physician immediately.

Usual dosage unless otherwise instructed by the physician:

Adults and children over 12 years of age: 10-20 ml (2-4 teaspoons) after a meal and before going to bed, up to 4 times daily.

Children 6-12 years of age: 5-10 ml (1-2 teaspoons) after a meal and before going to bed, up to 4 times daily.

This medicine is usually not intended for infants and babies under 6 years of age.

If there is no improvement in your condition within 7 days, refer to the physician.

Please note:

Wait at least two hours between taking this medicine and taking of other medicines orally.

Directions for Use:

Shake well before use.

Take the medicine after a meal and before going to bed.

Avoid Poisoning!

This medicine, and any other medicine should be stored in a closed place out of the reach of children and / or infants to avoid poisoning.

If you took an overdose, or if accidentally, a child swallowed this drug, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the medicine package with you.

Do not induce vomiting without being instructed to do so by a physician!

Drugs should not be taken in the dark! Check the label and the dose each time you take this medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: Store in a cool place, below 30°C. Do not store in the refrigerator or freezer!

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date stated on the package. In case of doubt, consult with the pharmacist who dispensed the medicine to you.

Do not store different drugs in the same container!

Registration number: 141 67 31756 00

Manufacturer: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Dansom Lane, Hull, UK.

Registration holder: Reckitt Benckiser (Near East) Ltd., 6, Hanagar st., Hod HaSharon 45240.

The format of this leaflet has been determined by the Ministry of Health and its content has been examined and approved - Sep. 2009.

چاقيسكون

سائل نعناع

التركيب:

المواد الفعالة وكيفيتها / تركيزها:

Sodium Alginate 50mg, Sodium Bicarbonate 26.7mg, Calcium Carbonate 16mg/ml.

المواد غير الفعالة:

Purified Water, Carbomer, Methylparaben, Sodium Hydroxide, Sodium Saccharin, Propylparaben, Peppermint oil.

تحوي كل ملعقة صغيرة (٥ ملتر) ٦٠.٥ ملغم صوديوم.

بدون جلوتن

بدون سكر

الفعالية الطبية: للتحفيز عن حرقان (حموضة) المعدة ومشاكل الهضم.

دلاائل الاستعمال المصادق عليها:

علاج أعراض الارتداد (عودة الغذا) المعدى - البلعومي، غازات تتعلق بالارتداد المعدى، حرقان المعدة أثناء الحمل، جميع حالات الضائقة البطنية العليا أو ما وراء عظم الصدر، عندما يكون السبب الأساسي هو الارتداد المعدى.

متى يمنع استعمال المستحضر؟

يُمنع استعمال الدواء إذا كانت هناك حساسية لأحد مركبات الدواء.

يُمنع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بداية العلاج:
إذا كنت بحاجة لتقييد كميات الصوديوم أو الكالسيوم في تغذيتك.

تحذيرات:

المستحضر يحتوى على أسيرتام، والذي هو مصدر الفنيل الألانين، والمحظوظ على مرضي الفنيلكيتونوريا.

تفاعلات مع العاققير الأخرى:

إذا كنت تتعاطى / تتعاطين دواء آخر، أو انتهيت مؤخرًا من تعاطي دواء آخر، فعليك مراجعة الطبيب، لتفادي الأخطار وعدم النجاعة الناجمة عن التفاعلات بين العاققير.

اعراض جانبية:

بالإضافة إلى الفعالية المرغوبة للدواء، قد تظهر أثناء استعماله التأثيرات الجانبية مثل: طفح جلدي، صعوبات في التنفس. في هذين الحالين يجب استشارة الطبيب.
في حالة تناول كمية أكبر من اللازم من الدواء، قد يظهر الشعور بالانتفاخ. في هذه الحالة يجد استشارة الطبيب.
إذا شعرت بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا حدث تغيير في شعورك العام، فعليك استشارة الطبيب فورًا.

الجرعة المتبعة في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

للκκιαρ والأولاد فوق سن ١٢: ٤٠ - ٢٠ ملتر (٤ - ٢ ملاعق صغيرة)، بعد وجبة طعام وقبل النوم، حتى ٤ مرات يومياً.
للأطفال ما بين ٦ - ١٢ سنوات من العمر: ١٠ - ١٥ ملتر (ملعقة صغيرة واحدة أو اثنان)، بعد وجبة طعام وقبل النوم، حتى ٤ مرات يومياً.
هذا الدواء ليس مخصصاً عادة للأولاد والرضع تحت ٦ سنوات من العمر.
إذا لم يطرأ التحسن على حالتك خلال سبعة أيام، فعليك مراجعة الطبيب.

يرجى الانتباه:

يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وتناول أدوية أخرى عن طريق الفم.

طريقة الاستعمال: يجب خفض السائل جيداً قبل الاستعمال.
يجب تناول الدواء بعد وجبة طعام وقبل النوم.

منع/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/ أو رضع لتفادي إصابتهم بتسوس. إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع ولد من الدواء سهواً، عليك مراجعة غرفة طوارئ المستشفى، ومعك عبوته الدواء.
يُمنع تسبب التسمم بدون تعليمات واضحة من الطبيب!
يُمنع تناول أدوية في الظلام؛ يجب فحص رقعة الدواء والتتأكد من الجرعة قبل كل تناول للدواء. يستعمل/ي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

التخزين: في مكان بارد، دون ٣٠ درجة مئوية. ليس في البراد أو المجمد!

حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة والتخزين الموصى بها، فإن الأدوية لا تبقى صالحة لمدة طويلة. يرجى الانتباه إلى تاريخ انتهاء مدة صالحية الدواء؛ في أية حالة من الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. يمنع خلط ليقوذكس مع أدوية أخرى في نفس الوعاء.

رقم تسجيل الدواء: ٠٠٥٧٣٦٧٦٤١

اسم وعنوان المنتج: ركيت بنكيرز هيلثكير (المملكة الموحدة) م.ض.. إنجلترا.

صاحب التسجيل: ركيت بنكيرز (نيبر إست) م.ض.. شارع هنچار ٦، هود هشارون ٤٥٢٤٠.

حدّدت صيغة هذه النشرة من قبل وزارة الصحة وفُحص مضمونها وأقرَّ من قبلها - سبتمبر أيلول ٢٠٠٩.