



בפנטן® פלוס

קָרָם

הרכב:

כל גרם מכיל:

דקספנטנול 50 מ"ג

כלורהקסידין דיהידרוכלוריד 5 מ"ג

לרשימת החומרים הבלתי פעילים – נא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

1. למה מיועדת התרופה?

לחיסוי וריפוי פצעים עם חשש לזיהום כגון גירויים קלים בעור, פצעים, חתכים, כוויות קלות ודלקות עור.

קבוצה תרפויטית:

דקספנטנול - פרו ויטמין 85

כלורהקסידין דיהידרוכלוריד - מחטא (אנטיספטי)

2. לפני השימוש בתרופה

ⓧ אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לדקספנטנול, לכלורהקסידין דיהידרוכלוריד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- אין למרוח תכשיר זה על עור תוף מנוקב.
- אין להשתמש בבפנטן® פלוס לפצעים עמוקים, חמורים או מזוהמים. טיפול בפצעים אלו יתבצע על ידי הרופא.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

• לפני הטיפול בבפנטן® פלוס ספר לרופא אם:

- הנך סובל ממחלה כלשהי.
- הנך סובל מאלרגיות, רגיש לחומר כלשהו או לתרופה כלשהי.
- יש להימנע ממגע עם העיניים, האוזניים ורקמות ריריות.
- שימוש חוזר באותו שטח עור עלול להוביל לגירוי העור.
- בפנטן® פלוס מתאים לשימוש על שטחי עור מצומצמים בלבד. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.
- פצעים נרחבים, עמוקים, חמורים או מזוהמים וכן עקיצות/נשיכות ופצעי דקירה דורשים פנייה לרופא/טיפול רפואי בגלל הסיכון לזיהום טטנוס.
- יש לפנות לרופא במידה וגודל הפצע איננו קטן לאחר זמן מה או במידה והפצע איננו מחלים בתוך 10-14 יום. הדבר נכון גם לגבי פצע בעל שוליים אדומים מאוד, במידה והפצע מתנפח או מאוד כואב וכן במידה והפצע מלווה בחום (קיים סיכון לתגובה מערכתית לזיהום חיידקי חמור - ספסיס).
- אין להשתמש בתכשיר לטיפול בגירויים אשר הסיכון שיזדהמו נמוך (לדוגמא: כוויות שמש).

ⓧ תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם, תרופות למריחה על גבי העור ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
אין להשתמש באזור המטופל בבפנטן® פלוס, בו זמנית גם בסבונים, דטרגנטים וחומרים מחטאים אחרים.

ⓧ הריון והנקה:

אם הנך בהריון או מניקה היוועצי ברופא או ברוקח לפני הטיפול בבפנטן® פלוס. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.

ⓧ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של בפנטן® פלוס:

תרופה זו מכילה צטיל אלקוהול, סטאיריל אלקוהול ולנולין, אשר עלולים לגרום לתגובה עורית מקומית (כגון דלקת עור אטופית).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח כיצד להשתמש בבפנטן® פלוס.

אופן השימוש ומינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא: מרח שכבה דקה על האזור הנגוע עד 4 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

ניתן לחבוש את הפצע או להשאירו חשוף.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולה להופיע עלייה באנזימי כבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה שאל את הרופא או הרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבפנטן® פלוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים:

- תגובות אלרגיות כגון דלקת עור הקשורה למגע עם חומר, דלקת עור אלרגית, גרד, אודם, אקזמה, פריחה, חרלת (אורטיקריה), גירוי העור, תחושת בעירה או שלפוחיות.
- תגובת רגישות יתר, תגובה אנפילקטית, שוק אנפילקטי הכולל ביטויים מעבדתיים וקליניים כגון אסתמה. תגובות של העור, מערכת הנשימה, מערכת העיכול, או ליקוי במערכת הנשימה, הלב וכלי הדם.
- עלייה באנזימי כבד - עלולה להופיע לאחר נטילת מינון יתר. ראה גם סעיף 3 - "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר".

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי איחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.
- אחסן באריזה המקורית.
- ניתן להשתמש בבפנטן® פלוס עד 12 חודשים מיום פתיחת האריזה. מומלץ לרשום את תאריך הפתיחה על האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על חומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

DL-pantolactone, Cetyl alcohol, Stearyl alcohol, White soft paraffin, Liquid paraffin, Wool fat (lanoline), Macrogol stearate, Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קָרָם בצבע שמנת.

גדלי אריזה מאושרים: 3.5, 30, 100 גרם.

יתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

בעל הרישום וכתובתו: באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45240.

היצרן: GP גרנז' פרודקשנס, אמיל ברל 7, D-79639 גרנז' ויילן, גרמניה.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אפריל 2015

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 01 26501 48 127

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

BEPA PLUS CRE PL SH 200515