

עלון לצרכן לפי תקנות הרחיקים (התכשירים והתשמ"ו - 1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו

בטרם תהביט/י בתרופה

פורטט עלון זה דקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו בפברואר 2012

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא.

עלך להשתמש בה בצורה הנכונה.

היוועץ/י ברוקח אם הינך זקוק/ה למידע נוסף.

עלך לפנות אל הרופא באם שינוי המתחלה (הסימפטומים) מתחיל/ה אצל אינם משתפרים.

לאחר שלושה ימים.

אצטוסל 300 מ"ג

טבליות

הרכב: כל טבליה מכילה:

Acetylsalicylic Acid 300 mg

חומרים בלתי פעילים: Starch, Aerosil

קבוצה תרופית:

נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

התוויה: שיכון כאבים, הורדת חום, טיפול בתהליכים דלקתיים לא זיהומיים (אנטי-רואמיטי).

(טיפול במחלות רואמיטיות רך לפי הוראות רופא).

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשו בתרופה זו כאשר הינך מיניקה. אין להשתמש במהלך הטרמיסטר השלישי להריון.

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים או מקבוצת הסליציליים. אין להשתמש במקרה של הסטוריה של אסתמה אשר נגרמה עקב חשיפה לסליציליים או חומרים עם פעולה דומה, בעיקר מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים. אין להשתמש בתכשיר אם הייתה לך בעבר תגובה אלרגית נטילית משךר כאבים כלשהו. אין ליטול בזהירות עם תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים. אם עברת זה עתה, או הינך עומד/ת לעבור ניתוח.

אין להשתמש בתרופה זו בילדים ומתגברים עד גיל 16 מחלות חוליות בחום כדוגמת שפעת או אבעבועות רוח מתוך חשש לתסמונת ריי.

אין להשתמש בתרופה זו בחולי אסתמה בשילוב עם פוליסים באף.

אין להשתמש בתרופה זו בחולים הסובלים או שסבלו מניכב בקיבה או במעי, קושי עיכול (דיספסיה), דימומים, בחילות, המופיעים - הפרעות בקרישה או בתפקוד החוץ הדם - תרומבוציטופניה (מיעוט טסיות). יש להימנע משימוש בזהירות עם תכשירים נוגדי קרישה במקרה של אי ספיקת כליות, אי ספיקת כבד, אי ספיקת לב חריפה.

אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון. אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסתמה, ריזומים כרוניים בדרכי הנשימה, קדחת השתת או פוליסים באף), חלב ו/או כלי דם, הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (היסטוריה של כיבים במערכת העיכול או דימום במערכת העיכול), מערכת הדם (כגון הפרעות קרישה), צרבת, יתר לחץ דם.

אין להשתמש בתרופה זו אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מבעיה בקיבה, כגון: צרבת, כאב בטן או כיב עיכול, בעיות בקרישת דם, מחלות לב וכליה.

אם הינך נוסט/ת משתנים, אם הינך מעל גיל 60, אם נטילת תרופה מקבוצה זו או דם משךר כאבים, אחר גרמה בעבר לתופעות לואי חמורות.

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מ: אנמיה, הדיורציה, שידון (גאוס), תפקודי כבד לקויים, לופס. בילדים או במתגברים הסובלים מחלות זיהומיות ויראליות המלוות או אל מלוות בחום.

אם הינך סובל/ת מאלרגיות (תגובות עוריות, גרד, סרפדת [אורטיקריה]).

אזהרות: אין להשתמש בתרופה זו בילדים ומתגברים ללא התייעצות עם רופא.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות ולתקופה העולה על 3 ימים ברציפות בלי להיוועץ ברופא.

אם הינך רגיש/ה ללחץ כלשהו או לתרופה כלשהי, עלך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, בטיפול ממושך בתרופה או בטיפול במינונים גבוהים, יש לערוך בדיקות דם ותפקודי כבד וכליה.

יש לדווח לרופא, אם להפסיק טיפול אם אינך ניטל על פי הוראות רופא. 5 ימים לפני התערבות כירורגית, ניתוח או טיפול דנטלי. אם הינך צורך/ת 3 או יותר אשקאות מאלקולי ללילה, דימומים בקיבה, ליטול תכשיר זה או להשתמש בתכשיר אחר לשיכון כאבים ו/או להורדת חום, שכן חומצה סליצילית/אסליצילית בשילוב עם אלקולחל עלול לגרום לדימומים בקיבה. נטיית תכשיר זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה במיוחד: אם: עברת גיל 60, הינך נוסט/ת תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, הינך צורך/ת יותר מ-3 מ אשקאות אלקוליה ליום. נטילת תכשיר זה במינון גבוה מהממלץ או למשך יותר מ-10 ימים עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או תהליך לב ולידמום בקיבה.

באשר לסיכון אבעבועות רוח - אין להשתמש בתכשיר למשך 6 שבועות.

צריכה ממושכת של משככי כאב יכולה לגרום לכאבי ראש. צריכה קבועה של משככי כאב, ובייחוד צריכה זיהומית של משככי כאב מסוגים שונים עלולים לגרום לפגיעה כליתית.

תגובות תרופתיות: אם הינך נוסט/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, עלך לדווח לרופא המטפל כדי למנע סיכונים או אי-עילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד

לגבי תרופות מקבוצות הבאות: תרופות נגד בחילה (מטוקלוראמיד, דומפרדון), תרופות נגד קרישת דם, תרופות נגד סוכרת, סטרואידים, חומצה אסקורבית (ויטמין C), תרופות לטיפול בשידון (פרובנציד, סולפינפירזון, פנילבטון), תרופות לטיפול בלאקומה (אצטאזולאמיד), תרופות לטיפול באפילפסיה (חומצה ולפרואית, סטרואין), מוטורקסאנט, תרופות משנתות (פירומיד, ספירונולקטון), תרופות אנטיביוטיות (ממשפחת הטטראציקלינים, נוקזימין), תרופות נוספות בעלות פעילות מושככת כאבים ונוגדי דלקת, סליצילאטים אחרים או נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, תרופות לטיפול במחלת החיסוני הנרכש (זידודין), תרופות המשנות את ה- pH של השתן (סוטר חומצה, ציטראט, מעכב האנזים קרבונק אנהידראז), מיפפרסטרן, תרכיב אבעבועות רוח, תרופות לטיפול ביתר לחץ דם (ACE inhibitors - כמו ראמיפריל, אנלפיריל, קאפטופריל וחוסמי תעלות סידן). תגובות נוגדות כדאון ממשפחת ה- SSRI (כגון פלואוקסטין), קאפסופרין, טרולוימוס, דיגוקין, ליתיום, חומצה קיטויטית, יקינון בילוב (תוסף מזון).

תופעות לואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לואי, כגון: כאבי בטן, קלים וצרבת, בחילות והקאות. תופעות אלו חולפות בתוך ככל תוך זמן קצר לאחר תקופת הסתגלות הדרכשיר, אולם אם הן נמשכות או מטרדות, היוועץ/י ברופא.

תופעות המחייבות התייעסות מיוחדת: בחילה, סחרחורת, חולשה (דירי); הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא. יצירת יתר של רירית הקיבה (דירי); הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.

תופעות לואי נדירות:

דימומים ממומים כגון דימומים מוחיים (בייחוד בחולים עם יתר לחץ דם לא מאוזן) ו/או המופיעים בתרופה נגד קרישת דם); הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.

העלאת הסיכון לדמם כגון: דימום לאחר ניתוח, שפיט דם, דימום מהאף, דימום מהעור, דימום של איברי המין ודרכי השתן, דימום מהמעינים; הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.

צואה דמית או שחורה או שחורה והקאות דמיות (דירי), אנמיה מערבדיתת וקלינית המתבסאת בחולשה, חיוורון, תת זרימה של דם לרקמות: הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.

דלקת וכיבים במערכת העיכול (דירי), דאש בנטיבות מוטיות מלוות בשפיט דם וניקוז דור המעי (דירי) (מאוד), ליקוי זמי בתפקוד הכבד ועלייה באנזימי הכבד (דירי מאוד), דלקת במערכת העיכול (דירי); הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא מיד.

תגובה אלרגית רב מערכתיתת הכוללת תגובות כגון: פריחה, אורטיקריה, בצקת, פרויטסי, צניחה בלחץ הדם, התקפים של קושי נשימה, חלת, גודש באף, התנפחות הפנים, הלשון והעול (אנגיואדמה), תגובות עוריות חמורות (שוק), ובמקרים נדירים תגובה חמורה הכוללת שוק אנפילקטי: הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא מיד.

סחרחורת, טנטון, כאב ראש, שיבוש בשמיעה, בלבול מנטלי - יכולים להיות סימנים לניטון יתר; הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא. הינך חייך שנה/ עיולפון, הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עלך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים: הורהים לדווח לרופא המטפל על כל תועת לואי וזו על כל תרופה נוספת היענת לידל/ה. ראה/י לעיל אזהרות מיוחדות שפורטו.

אין מקובל הבעיד הרואה אחרת מרופא: לפני השימוש הראשוני בתרופה - יש להיוועץ ברופא.

שיכון כאבים והורדת חום:

ילדים ומתגברים: אין להשתמש ללא הוראת הרופא.

למבוגרים: 1-2 טבליות כל 4-6 שעות. אין לעבור על המנה המומלצת. אם לא חל שינוי במצב תוך 3 ימים יש לפנות לרופא (למטט אם ניתן על-ידי הרופא לטיפול במחלות רואמיטיות).

טיפול במחלות רואמיטיות: לפי הוראות רופא. אין שסחת לטיפול בתרופה זו בזמן קצוב. יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

אופן השימוש: אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם סוס מים מלאה, יש ליטול את התרופה עם הארוחה או אחריה. אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש בבלעית.

אין לשכב 15-30 דקות לאחר נטילת התרופה.

מנעי הרעלה: תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשבור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או יתמנות ועל-ידי כך תמנעי הרעלה. אין נטלת מנות יתר או נטלות בלע ילד מן התרופה. מנעי/י את לחדור מיון של בית-חולים, והבאי/י אריות התרופה איתך.

אין לגנוח להקאק ללא הוראה מפורשת מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחרת/ת הינך עלולה לחזיק. **אל יתני/י תרופה זו לרובך, שכניך או מכרך.**

אין ליטול תרופות בחושר/י יש לבדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוסט/ת תרופה. יש להרכיב משקפים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: אחסון בטמפרטורה מתחת ל- 25°C. גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצת, תרופות משגורות לתקופה מוגבלת בלבד. לא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר/ו בכל מקרה של ספק, עלך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 020 68 20911 00

יצרן: רקח תעשייה פרמצבטית בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון.