

עלון לצרכן לפי תקנת הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986.

התרופה מושקת ללא מרשם רופא.

זילרג'י - קפוליות 10 מ"ג

כל קפליה מכילה:

צטיריין דיידרולוריד
(Cetirizine dihydrochloride) במינון 10 מ"ג.
מרכיבים בלתי פעילים מופיעים בטופי 6.

קרא בעיון את הנוהל עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכליל מידע מנציח על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. **התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6.** עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) ממשיכים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

זילרג'י מיועדת לטיפול במספטומים של דלקת אף אלרגית עונתית (קדחת השתה) או רב שנתית (שבן הסתמיה). תסמיניה, עיניים מזות, גירוד באף וא בעיניים (דמעות) ולטיפוח בסרפדת (חרחול) (חרחול, חרחול, אשר מאפיינת בגירוי בעור (כגון: גירוד, פריחה).

קבוצה תרופתית: שיכת לקבוצת תרופות הנקראת אנטיהיסטמינים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם הינך:

- גרש (אלרגי) לחומר הפעיל, כל אחד מהמרכיבים הנספחים אשר מכילה התרופה (ראו טעף 6), לתרופה אחרת ממספחת אנטיהיסטמינים המכילה הידרוקסיזין או לתרופות אחרות ממספחת הפפירין לזוגמא: בוקליזין, קיצילין, מקלזין, לבצטיריין.
- מתיקה.
- כובל מחלת כליות חמורה או מכשל כליתי חמור (פינוי קרטינין נמוך מ-1 מ"ל לדיקה).
- כובל במעיות של אצירת שתן.
- בעל אי סבילות לסוכרים מסוימים (תכשיר זה מכיל לקטוז).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה: לפני הטיפול בהתרופה יש לספק לרופא והיוועץ באם:

- הינך בהריון, חושבת שהינך בהריון או ננסה להיכנס להריון (לראו טעף הרון והמקה).
- הינך גורד לזמן ולשהו או לתרופה כלשהי.
- הינך כובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה/ מערכת השתן, בלוטת הערמונית, הכבד, הריאה ו/או כל דדם, ממפנימה או בהנכסטיס כרונית.
- הינך כובל מאפילסיה או הינך ניסיון לפרסוסים.
- הינך כובל מגורמים המשפיעים על ניטיה לאצירת שתן (כגון: פגיעה בחוט השדרה, הגדלת בלוטת הערמונית) מכיוון שצטיריין מגביר את היסכון לאצירת שתן.

לפני בדיקה לאבחון אלרגיה, הפסק את נטילת התרופה 3 ימים לפני הבדיקה כיוון שנטילת התרופה יכולה להשפיע על תוצאות הבדיקה. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

- טיפול ממושך בתרופה מעלה את היסכון לזיהומי שניפים או תסמינים, יש ללאו להיגייט פה הולמת.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם הינך כובל נטילת תרופות משפיעות על מערכת העצבים המרכזית כגון תרופות לנרד, לטיפול בדיכאון, להרגעה, ריטוביניר (לטיפול ב-HIV, גניף הכשל החסיני האנטי) או תיאופילין.

אין להשתמש בזילרג'י יחד עם תרופות אחרות ממספחת הפפירין לזוגמא: בוקליזין, קיצילין, מקלזין, לבצטיריין.

שימוש בתרופה ומזון
ניתן לטול את התרופה עם אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
אין לשתות יינות או משקאות אלכוהליים בתקופת הטיפול עם התרופה.

הריון והנקה
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון, חושבת שהינך בהריון או ננסה להיכנס להריון. כמו בתרופות אחרות, יש להימנע בשימוש עם זילרג'י במהלך תקופת ההריון, שימוש בטעות בתרופה בזמן ההריון, כל הנראה לא יגרם נזק לעובר. יחד עם זאת, יש להפסיק את השימוש בתרופה.

אין להשתמש בתרופה כאשר הינך מתיקה.

נהיגה ושימוש במכוונות
לאישים מסוימים תרופה זו יכולה לגרום נמנום, עיפות, אובדן חושב ותופעה זו לאחר תשומת ערנות בזילרג'י, יש להימנע מכל פעילות המהיית ערנות כגון: נהיגה ברכב או הפעלת מכוונות מסוכנות. כאשר לילדים, יש להזהרם מרכיבה על אופניים או ממספחת קברית הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה זילרג'י מכילה לקטוז. לא נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. **תכשיר זה אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 6 שנים.**

המינון המוקבץ בהעדור הוראה אחרת מהרופא: ילדים בגיל 6-12 שנים: חצי קפליה פעמיים יום בבוקר ועברו או לקפליה 1 פעם ביום. ילדים השוקלים פחות מ-30 ק"ג: חצי קפליה פעם ביום.

מגורמים וילדים מגיל 12 שנים: קפליה 1 ליום לכל היותר.

מגורמים מעל גיל 65 ומטופלים בעלי תפקוד כבדי או כליתי לקוי: יש להיוועץ ברופא.

אם אתה מרגיש נמנום או מוסחר, נטילת חצי קפליה פעמיים יום יכולה להפחית תופעות אלו.

יש לבזע את התרופה עם כוס מים, אפשר עם אוכל. אין מידע לגבי תופעות.

אין לעבור על המנה המומלצת. היוועץ ברופא אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה זילרג'י חלשה או חזקה מדי. אם התסמינים ממשיכים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים, יש להיוועץ ברופא.

אם נטלת תרופה בעונה חמה יתר או אם בטעות ילד בלע מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך. אם נטלת מכלי בובה הממונת לתיכנת תופעות כגון: שינוניות, אי שקט, נמנום, רגזנות, עיפות, בלבול, לשלשול, סחרחורות, כאב ראש, הרגשת חול, הרחבת האישונים, גירד, הרגעה (צדקה), ערפול, ששים, קצב לב מהיר לא תקין, רעד ואצירת שתן, זכור לא להנאז במצבים אלה.

אם שכחת לטול את התרופה בזמן הדרוש, אין לטול מנה נפלה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין לטול תרופות בחושר! בדוק תהומה והמנה בכל פעם שהינך נטיל תרופה. הרכב משפכים אם הינך קולקת. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו כל תרופה, השימוש בזילרג'י עלול לגרום לתופעות לוואי. חלק מהמשמשים. לא תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבל מאף אחת מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא אם מתפתחות התופעות הבאות:

- תופעות תסמינים של שוק או תגובה אלרגית חמורה (בדיר מאוד) כגון: קוצר/קוצר נשימה, פריחה, גרד, חום; נפיחות של הגרון, תסמינים, תסמינים, הצואה, הילוש, השפתיים ו/או תבלות אחרים בגוף. הנגובה זו יכולה להופיע מיד בנטילת התרופה בפעם הראשונה או לטוית מאוחר יותר.
- לופיה להפצע ו/או לזמם יותר מהרגיל.
- פרוסוסים/עוויות.
- חוסר מנחה, גרשות העור למגע, נמנום, אי נוחות בקיבה.
- כאבי ראש, לשלשול בילדים, יובש בפה, סחרחורת, עיפות, תופעות של שיכחות.
- חלשה או הרגשת כללית לא טובה, לשלשול, תופעות אלה אינן שיכחות.
- חמדות אובדניות (בדיר מאוד).
- חלשה, בלבול, שיו בתפקודי כבד כגון תוצאות לא תקינות של תפקודי כבד, קצב לב מואץ (מופיעות לעיתים נדירות), עלפון.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שיכחות- תופעות שמופיעות 10-15 משמשים מתוך 100: שינוניות, בחילה, כאב בטן, סחרחורת, דלקת חלוק (כאב גרון), תסמינים דמויי הצטננות באף (בילדים בלבד), נפיחות או גירוי באף (דלקת אף, דמנום המאף).

תופעות לוואי שיכחות- תופעות שמופיעות 10-15 משמשים מתוך 1,000: גירוד ו/או פריחה, תחושת נימול, עקצוץ, כפפות ידיים והרגליים, חוסר מנחה, שלפוחית בעור, עצבנות, דודי שינה.

תופעות לוואי נדירות- תופעות שמופיעות 1-10 משמשים מתוך 10,000: בצקת (נפיחות כללית קבועה אצירת זדלים), דלקת כבד, עליה במשקל, תופעות אצירת ואריית או ששעת דבר של ירימים (זרות), סרפדת (נפחות, אדמוניות וגירוד העור), עמדות מרה (כלסטוס), דלקת פקיעת הכליה, אדמונית הממליט, נטעות או רצונות בפנים, תת לחץ דם מומר, מיטוט נטיות דם (סרומבוציטופניה), הפרעות בתנועה, קשקות שרירים, רעד, טיקים (נטעות שרירים תאומיות, לא רצונות, חזרות), בעיות בראייה כגון ראייה מטושטשת, בריחת שתן, כאב אף קושי במתן שתן, שנינים בחוש הטעם, עליה במשקל.

תופעות לוואי נדירות מאוד- תופעות שמופיעות כפחות משמשים מתוך 10,000: קושי במיקוד הראייה, נטעות סיבוב לא רצונות של העיניים, דמנום או תברות חריגות, טעם רע בפה, נטעות לא רצונות או אצירת זדן של הגפיים, עוויות בשרירי הצוואר והכתפיים, נפיחות בעור בייחוד בפנים, גירוד, פריחה, חזרות, רגזנות בליה, פריחה טבעית אפליטת בגוון אדום, הפרשת שתן לא תקינה.

תופעות לוואי נספחות: אובדן זיכרון ו/או הפרעה ביחיון, קושי בריצה, אנורקסיה, הסמקה, ריור, אצירת שתן, אי-קשיות לב, יתר לחץ דם, פגיעה בקואורדינציה, קושי בשליטה בתנועה, ליקוי בהוצאת קול, יתר תנועה, מתח שרירי גבוה, גרשות נמוכה לכאב, התכוונות ברזלים, מגירה גבוהה, דלקת בעצב חוט השדרה, שיתוק, צניחת עפעפים, עוויות, וריטון, ליקויים בשדה הראייה, החמרה בששעת, עצירות, קושי יעול, גיהוק, גזים, דלקת בקיבה, סחרוס, עליה בתאבון, צאה שחורה, דמנום קרטי, דלקת הפה (סטומטיטיס) כולל דלקת כיבית, שיוני בצבע בלישה, בצקת בלישה, דלקת שלפוחית השתן, דם בשתן, דחוסות במתן שתן, השתנה יתר, אי שליטה במתן שתן, זיומים בדירי השתן, כאב אצוים, רעילות לאזן, נטנון, תשיבות, סוכרת, צמא, כאב מפרקים, דלקת מפרקים, חמלת מפרקים ניונית, חולשת שרירים, כאב שרירים, מחשבות חריגות, חשק מיני יתר, כוול עצימי (פרופוליציה) או הפרעת רגשית, התחממות חו, חלומות רעים, תרופות שניה, דלקת סמפנות (בוכטיס), קצר נשימה, ששית יתר, לוח ממברתי לואר, אריות הפרעות ששית, סיסטיטיס, דמנום בדירי השמיה העליונה, כאב ממוח, כאב בחזה (בשמים), דמנום בין ממוח, הפרשה לבנה מהמרתק, דמנום יתר בוחס דלקת נרתיק, הגדלת בלוטת הלימפה, אקנה, התקררות, דלקת עור, יובש בעור, אקזמה, הפעת מוסרט מומליות, תרקות יתר (הפרקורטוס), ששית יתר, הרעה ממברתי, תגובת גרשות חל, תגובה רעילה לרשות לואר, ארגמנת הפרשת חלב (בוברא), הפרעות ערויות קשיר עור, פגיעה באוזן הריח, איבוד טעם, עיוותון, דלקת חלמית, כאב בטן, אלקוקמה, אובדן יכילת מלח דלקת דמנום, יתר, יובש עין, פגיעה לא מכוונת, תששית, כאב גב,

כאב חזה, הגדלת הבטן, הבקיק חום, בצקת ברגל, פוליסם כאף, כאב, תגובות מסביב לעיניים, קשיחות.

תופעות לוואי נדירות- תופעות שמופיעות 1-10 משמשים מתוך 1,000: דמנום אפי, כיוץ ממונות הקאות, גזים, כאשור אחר לרופא המטפל על כך תופעת לוואי וכן על כך תופעה נוספת הניתנת לידל! ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי ממחירה, כאשר אתה כובל מתופעות לוואי שולא צויה בעלון או אם חל שיוני בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות חליצה על הקישור "דווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי". שנוצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדווח על תופעות לוואי, או ע"י ניסוח לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence?https://forms.gov.il/globaldata/AdversEffectMedic@.moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מקום בטוח!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במזרקה סגורה מוחזקת לרשימה יום של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחר תאריך התפוגה (exp. date) הנפוצה על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של איות חודש.
- אחסן במטמורטורה נמוכה מ-25°C.
- אחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: סוכר, Lactose monohydrate, maize starch, starch, copolymerised, povidone, talc, basic butylated methacrylate copolymer, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 6000.

כל קפליה מכילה כ-62 מ"ג לקטוז.

כיצד ירשם התרופה ומה תוכן האריזה: קפוליות לבנות עם חץ חלוקה בצד אחד. גלי אריזה מאושרים: 5, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 36, 100. יתכן שלא כל גלי האריזה משוקקים.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: ינואר 2016.

מספר ירשום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 116 43 29833 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בשלון זכר, אולם המידע בעלון והתרופה מיועדת לבני שני המינים.

יצרן ובעל הזכויות:

דקסל® בע"מ

רח' דקסל 1, אור-עקיבא 3060000, ישראל