

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

טיו ג'ל

הרכב: איזוטיפנדיל הידרוכלוריד 0.75%
Isothipendyl Hydrochloride 0.75%
לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר
ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם
תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע
תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות
נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא
והיא מיועדת למבוגרים ולילדים מגיל 30
חודשים ומעלה.

מינון לילדים מתחת לגיל 6 שנים: יקבע
ע"י הרופא.

עלך לפנות לרופא אם התסמינים אינם
חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש
בתרופה.

אם אתה מבחין בתופעות לוואי שלא
מופיעות בעלון זה, או אם אתה סובל
באחת מתופעות הלוואי באופן רציני, פנה
לרופא או לרוקח.

יש לקחת את התרופה בצורה נכונה.
היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התוויות: התרופה מיועדת להקלה זמנית
בגרוד עקב הפרעות קלות בעור כגון:
עקיצות (לא רעילות), גירויים, כוויות שמש
ודלקת עור אלרגית מקיסוס או מאלון.
קבוצה תרפויטית:

אנטיהיסטמין לשימוש חיצוני.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה זו:

- אם ידועה רגישות לאנטיהיסטמין או
לאיזוטיפנדיל או לאחד ממרכיביה
האחרים של התרופה.
- על פצעים פתוחים או מודלקים

אין להשתמש בתרופה מבלי להתייעץ
עם רופא לפני תחילת הטיפול:

אם הינך בהריון או מניקה.

אזהרות מיוחדות בנוגעות לשימוש
בתרופה:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות
בלי להיוועץ ברופא.

אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה
כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני
נטילת התרופה.

אין להשתמש על פצעים פתוחים, עור סדוק
או מודלק, בנוכחות שלפוחיות או הפרשות,
או על אבעבועות רוח או חצבת.

יש להימנע משימוש ממושך או נרחב
בתכשיר.

אין להשתמש בתכשיר זה בעיניים.
אין להשתמש על שטח גדול, מתחת לחבישה,
על עור פגום, או בתינוקות או פגים בשל
הסיכון של מעבר של החומר הפעיל לדם.

אין להשתמש על קרומים ריריים.
תרופה זו אינה קרם הגנה לשמש.

אין להשתמש בתרופה זו כקרם לטיפוח
עור בריא.

גירוד הינו סימפטום שיכולות להיות לסיבות
רבות הדורשות את עצתו של הרופא שלך
במיוחד במקרה של הפרעות מתמשכות
או החמרות.

אם אתה לוקח, או אם נטלת לאחרונה,
תרופות אחרות כולל תרופות ללא
מרשם ותוספי מזון וויטמינים, ספר על
כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה:

יש להשתמש בתרופה זו בזהירות במהלך
הריון והנקה.

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא
או ברוקח לפני התחלת השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים
של טיו ג'ל:

התרופה מכילה חומצה סורבית שעלולה
לגרם לתגובות מקומיות בעור (כגון אקזמה)

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם
אינך בטוח.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת
מהרופא:

יש למרוח על האזור הנגוע 2-3 פעמים ביום.
תרופה זו מיועדת למבוגרים ולילדים
מגיל 30 חודשים ומעלה.

מינון לילדים מתחת לגיל 6 שנים: יקבע
ע"י הרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.
אם לא חל שיפור במצב תוך 5 ימים יש
לפנות לרופא.

שימי לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת
לשימוש חיצוני בלבד.

יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים, רקמות
ריריות (כגון בפה ובאף) במקרה של מגע
עם העיניים, יש לשטוף אותן היטב במים.

אם שחת למרוח תרופה זו בזמן קצוב,
בשום אופן אין למרוח שתי מנות ביחד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע
ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או
לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת
התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות
והמנה בכל פעם שיהיך נוטל תרופה. הרכב
משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש
בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח

4. תופעות לוואי

כמו לכל תרופה, השימוש בטייו ג'ל עלול
לגרם לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.
יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

במקרים של תופעות לוואי הבאות פנה
לרופא:

- תגובות אלרגיות לטייו ג'ל
- מקרים נדירים של רגישות לאור (תגובה
בעור בעת חשיפה לאור שמש או קרינת
UV).

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם
הינך סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה
בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת
יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם
של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע
הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה
מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
(Exp. Date) המופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של
אותו חודש.

לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש
במשך 8 שבועות.

יש לאחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה
גם:

Purified water, sorbitol solution 70%,
Carboxymethylcellulose sodium, sorbic
acid, edetic acid, sodium hydroxide

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

גיל שקוף ארוז בשפופרת אלומיניום של
40 גרם

יצרן ובעל הרישום:

רקח תעשיית תרופות בע"מ, רח' המלאכה
30, חולון, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות
באפריל 2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות
הממלכתי במשרד הבריאות:

00 23 24394 140

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה
נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה
מיועדת לבני שני המינים.

מק"ט: 5TH1004A 04/14 גודל: 160/224